



عز الدين صالح ابراهيم

عبد العظيم عبد الحميد البكرى

اسم الباحث:

تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

طريقتين مختلفتين للتحكم فى نسبة السكر بالدم لمرضى القلب الذين يقومون بعمليات جراحية كبرى فى البطن وتأثيرها على الصحة العامة للمرضى .

طريقة البحث:

ان التحكم فى نسبة السكر بالدم من الأمور الهامة للمرضى فى فترة ما حول العمليات الكبرى وبخاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض بالقلب .



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

سلفات الماغنسيوم مقابل الليدوكايين بالتنقيط الوريدي لإضعاف الإستجابة الرافعة لضغط الدم نتيجة المنظار المتصلب للقصابة الهوائية

طريقة البحث:

يمثل المنظار المتصلب للقصابة الهوائية تنبئها مستمرا للمسك الهوائي مما قد يتسبب في تغيرات ملحوظة في الديناميكية الدموية . كان الهدف من الدراسة الحالية مقارنة تأثير التنقيط الوريدي لعقار سلفات الماغنسيوم و عقار الليدوكايين علي إضعاف الإستجابة الديناميكية الدموية للمنظار المتصلب للقصابة الهوائية



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

تأثير التحضير قبل التخدير بعقار الجابابنتين علي الالم والقلق أثناء جراحات المياة البيضاء تحت تأثير التخدير المحيط بالمقلة

طريقة البحث:

ان الهدف الرئيسي من التهدنة أثناء جراحات العين هو الحفاظ علي المريض هادنا ومستريحا بدون إخماد ردود الفعل المنعكسة الواقية للمسلك الهوائي أو الإضرار بالديناميكية الدموية. كان الهدف من البحث الحالي تقييم تأثير التحضير قبل التخدير بعقار الجابابنتين عن طريق الفم علي القلق والألم أثناء عمليات المياة البيضاء التي تمت بالتخدير المحيط بالمقلة



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

دراسة مقارنة بين ثلاث جرعات من الديكسميديتوميدين كمساعد لليدوكايين في التخدير الناحي الوريدي

طريقة البحث:

: الدراسات السابقة التي أجريت علي إضافة عقار الديكسميديتوميدين إلي المخدرات الموضعية في التخدير الناحي الوريدي أظهرت تحسن في نوعية التخدير و تحمل المريض لعصابة إيقاف النزف وتسكين فعال للألم بعد العملية ولكن حدود الجرعة لم يتم دراستها بعد. هذه الدراسة صممت لمقارنة الأثار الناتجة عن ثلاث جرعات من عقار الديكسميديتوميدين مضافة لعقار الليدوكايين في التخدير الناحي الوريدي علي نوعية التخدير والام بعد العملية والآثار الجانبية