



حمدي حمودة

امين فيصل اللقوة

اسم الباحث:

تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

مقارنة الطرق المختلفة للإستئصال اللاخيطي للجسم الزجاجي بالطريقة المعتادة في شتى أمراض الشبكية والجسم الزجاجي

طريقة البحث:

اشتملت الدراسة على 129 عينا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى تشتمل على 34 عيناً تم إجراء الجراحة لهما باستخدام نظام كلاس ذو القطر 20. المجموعة الثانية تشتمل على 32 عيناً تم إجراء الجراحة لهما باستخدام النظام ذو القطر 23. المجموعة الثالثة تشتمل على 27 عيناً تم إجراء الجراحة لهما باستخدام النظام ذو القطر 20 و 23. المجموعة الرابعة تشتمل على 36 عيناً تم إجراء الجراحة لهما باستخدام الطريقة المعتادة لإستئصال الجسم الزجاجي



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

تحليل الارتباط للتغيرات الجينية ألفا 2 بيتا 1 إنترين والإندوثيلين أكسيد النيتريك المصنع في اعتلال الشبكية في مرضى البول السكرى النوع الثانى.

طريقة البحث:

يعرف تقليديا اعتلال الشبكية السكري باعتلال الأوعية الدموية الدقيقة، و التي تؤثر في المقام الأول في الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين الداخلية نتيجة مضاعفات مرض السكري . وقد اقترحت أكسيد النيتريك وألفا 2 بيتا 1 إنترين (وهو مستقبلات الصفائح عن الكولاجين) لتلعب دورا هاما في التسبب في مضاعفات الاوعية الدموية الدقيقة في اعتلال الشبكية السكري.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

النتائج طويلة المدى لجراحة إحاطة صلابة العين بحزام 360 درجة حول العين مع إستئصال الجسم الزجاجي وحقن زيت سيليكون عند إختراق العين بطلق ناري.

طريقة البحث:

دراسه متتاليه لتقييم النتائج طويلة المدى عند إجراء جراحتي إحاطة صلابة العين بحزام 360 درجة و إستئصال الجسم الزجاجي مع حقن السيليكون معاً عند إختراق العين بطلق ناري.