



كلية الطب

وليد عبده

أشرف غريب عامر

اسم الباحث:

تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

هل قصور الشريان التاجي الصامت واضح في مرضى الروماتويد المفصلي؟

طريقة البحث:

هناك دراسات عديدة أظهرت أن مرضى الروماتويد المفصلي عرضة للمراضة و الوفاة بسبب قصور الشرايين التاجية و التي قد تصل إلى نصف الوفيات في مرضى الروماتويد المفصلي . نصف حالات القصور في الشرايين التاجية عند مرضى الروماتويد المفصلي صامتة بدون أعراض ولذلك فإن الإكتشاف المبكر لهذا المرض الصامت يقلل من حدوث الإعتلال والوفيات الناتجة عنه.
الهدف من البحث: أجريت هذه الدراسة لتقييم حدوث القصور الشرياني الصامت في مرضى الروماتويد المفصلي وتحديد عوامل الخطورة لهذا المرض



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

هل ارتفاع حمض البوليك فى الدم واحدا من مجموعة عوامل الخطورة لأمراض القلب والأوعية الدموية فى مرضى السكر من النوع الثانى ?

طريقة البحث:

Abstract: Background & Aim: The prevalence of hyperuricaemia (HU) in type 2 diabetic patients (T2DM) and its relation with diabetic micro- and macro-vascular complications has been conflicting. The aim of the present study was to investigate the relationship between HU and both micro and macroangiopathies (IHD and diabetic nephropathy and neuropathy) in patients with type 2 diabetes mellitus.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

دراسة الليبوكالين المصاحب بجيلاتينيز الخلايا البيضاء المتعادلة (NGAL) في البول في إصابة الكلى الحاد الناتج عن الصبغة بعد التدخل التاجي عبر الجلد

طريقة البحث:

يعد إدخال صبغة الأيودين داخل الأوعية الدموية سببا معروفا تماما لإصابة الكلى الحاد (AKI) و الذي بدوره يكون مصاحبا بالمرضاة و الوفاة داخل المستشفيات. في غياب علاج متخصص و فعال ل AKI فإن الاكتشاف المبكر و الدقيق له يكون أساسيا لمنع تطوره و هكذا لتحسن نتائجه ولذلك فإن السعي لتحسين التشخيص المبكر هو منطقة بحث مكثفة.

الهدف: كان هدف هذه الدراسة هو بحث قيمة تعيين الـ NGAL البولي في الاكتشاف المبكر لإصابة الكلى الحاد الناتج عن الصبغة (CIAKI) بعد التدخل التاجي عبر الجلد (PCI).



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

العدوى بفيروس الكبدى بى الخفى فى المرضى المصريين المصابين بالفيروس الكبدى سى: معدل انتشاره و تأثيره على حدوث سرطان الكبد

طريقة البحث:

تتميز عدوى فيروس بى الكبدى الخفى بتواجد الحمض النووى ثنائى الاتحاد لفيروس بى الكبدى فى كبد و مصل الأفراد السالبة فحوصاتهم للمستضدات السطحية لفيروس ب. ويمكن أن تكون الأجسام المضادة لفيروس بى الكبدى متواجدة أو لا. تتراوح نسبة وجوده فى الدراسات المختلفة من صفر إلى 52.3%.
الهدف من: دراسة مدى انتشار العدوى بفيروس بى الكبدى الخفى بين المرضى المصابين بفيروس سى الكبدى و تأثيره على حدوث سرطان الكبد.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

دراسة مسحية لمتلازمة الأيض على العاملين بمستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية

طريقة البحث:

إن متلازمة الأيض تعنى تزامن حدوث مجموعة من الأمراض مثل المناعة ضد عمل الأنسولين و السمنة و زيادة مستوى الدهون بالدم و ارتفاع ضغط الدم. لقد زاد انتشار متلازمة الأيض على المستوى العالمى و ينتظر استمرار تزايدها ولذلك الأمر يتطلب وضع إستراتيجية لمنع تلك الزيادة الغير معتادة على المستوى القومى. الهدف: هو دراسة متلازمة الأيض بين العاملين فى مستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية وذلك من خلال دراسة مسحية تستهدف استخدام التعريفات الثلاث و هى الطرق الثلاثية لمعالجة البالغين و التعريف الخاص بالفيدرالية الدولية لمرض السكر و التعريف المعدل لمنظمة الصحة العالمية لدراسة المتلازمة على هؤلاء العاملين للوقوف على عوامل الخطورة المحتملة لحدوث المتلازمة



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**الإكتشاف المبكر لمدى تصلب الشرايين في مرحلة ما قبل ظهور الأعراض في مرضى مقدمات الداء السكري:
دراسة باستخدام الدوبلكس للشريان السباتى الرئيسى و الشريان الفخذى.**

طريقة البحث:

يعتبر تصلب الشرايين السبب الرئيسى لأمراض انسداد الشرايين الطرفية, وبما أن مرض مقدمات الداء السكري هو مرحلة وسط من اختلال السكر بالدم بين المعدل الطبيعى ومرض السكر فإن قياس سمك الطبقة المبطننة للشريان السباتى و الفخذى يمكن أن يساعد على الإكتشاف المبكر لتصلب الشرايين فى هؤلاء المرضى. الغرض من البحث: يهدف البحث إلى دراسة التغيرات التى تنشأ فى فى سمك الجدار المبطن للشريان السباتى الرئيسى والشريان الفخذى فى مرضى مقدمات الداء السكري كإشارة مبكرة لحدوث تصلب الشرايين فى مرحلة ما قبل ظهور الأعراض.