



طارق هاشم

ايهاب أنور شلتوت

اسم الباحث:

تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/12/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

تقييم نوعية الحياة في مرضى سرطان المثانة الذين يتلقون العلاج الإشعاعي المكثف و العلاج الإشعاعي المكثف المصحوب بالعلاج الكيماوى جيمسيتابين

طريقة البحث:

سرطان المثانة البولية نسبة كبيرة من المرضى بالسرطان فى مصر و يشكل (يمثل علاج المرضى كبار السن تحديا كبيرا نظرا لوجود الكثير من الأمراض المصاحبة و ضعف الحالة العامة و الصعوبة الكبرى فى اجراء عملية استئصال جذرى للمثانة البولية) و هناك حاجة لتقييم نوعية حياة هؤلاء المرضى كجزء هام من خطوات العلاج



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/12/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

مقارنة العلاج الإشعاعي المكثف المصحوب بعقار جمزار و العلاج الإشعاعي المكثف لمرضى سرطان المثانة
البولية فى المراحل المتقدمة

طريقة البحث:

يمثل علاج مرضى سرطان المثانة البولية فى المرضى كبار السن تحديا كبيرا نظرا لوجود الكثير من الأمراض
المصاحبة و ضعف الحالة العامة و الصعوبة الكبرى فى اجراء عملية استئصال جذرى للمثانة البولية



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/12/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

نتائج علاج مرضى الليوكيميا الميلودية المزمنة الذين يتلقون العلاج الكيماوى الموجه كخط اول او ثانى

طريقة البحث:

مثل اكشاف العلاج الموجه لمرضى اليوكيميا الميلودية المزمنة اكتشافا كبيرا و ساعد على تحسن حالة العديد من المرضى و اصبح يمثل بديلا كفنا للعلاج الكيماوى (0) و يضا للمرضى الذين لن يتم عمل زرع نخاع لهم



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/12/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

تقييم استخدام عقار ريتوكسيماب مع العلاج الكيماوي في مرضى سرطان الغدد الليمفاوية المصابين بفيروس الكبدى "سى" فى مصر

طريقة البحث:

تمثل الإصابة بفيروس س مشكلة صحية كبرى فى مصر (0 و حينما يصاب المريض بسرطان الغدد الليمفاوية مع فيروس س فان ذلك يجعل من اعطاء العلاج الكيماوي و المناعي للمريض اكثر صعوبة



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

العلاج الكيماوى الممتد بعقار كابيسيتابين بجرعات صغيرة لمرضى المراحل المتقدمة من سرطان البنكرياس

طريقة البحث:

سرطان البنكرياس هو رابع سبب لوفيات السرطان بين الرجال والنساء، و يمثل نسبة تصل الى 6% من مجموع الوفيات ذات الصلة بمرض السرطان. العلاج الكيماوي القائم على استخدام جيمسيتابين بمفرده او مع ادوية اخرى هو العلاج القياسي لسرطان البنكرياس فى مراحله المتقدمة. ان نتائج علاج حالة المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس فى مراحل متقدمة لا يزال فى مستويات ضئيلة غير مرضية. للمرضى الذين يفشلون فى الإستجابة للعلاج الكيماوي بعقار جيمسيتابين تكون الخيارات العلاجية المتاحة خيارات محدودة و ذات نتائج ضعيفة



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

طريقة البحث:

أورام الغشاء البللوري الخبيثة هو ورم خبيث عدواني المنشأ ينجم عن التعرض لمادة الأسبستوس. يمكن الكشف المبكر عن أورام الغشاء البللوري الخبيثة تحسن كثيرا من فرص البقاء على قيد الحياة. في هذه الدراسة تم جمع السائل الجنبي نضحي من 44 مريضا (24 من الذكور والإناث 20) الذي قدم إلى العيادات في الجهاز التنفسي.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

العلاج بعقاري دوسيتاكسل و كاربوبلاتين بعد فشل العلاج بعقار جيمسيتابين المتبوع بالعلاج الكيماوى الممتد بعقار كابيسيتابين بجرعات صغيرة لمرضى المراحل المتقدمة من سرطان البنكرياس

طريقة البحث:

سرطان البنكرياس هو رابع سبب لوفيات السرطان بين الرجال والنساء، و يمثل نسبة تصل الى 6% من مجموع الوفيات ذات الصلة بمرض السرطان. العلاج الكيماوي القائم على استخدام جيمسيتابين بمفرده او مع ادوية اخرى هو العلاج القياسي لسرطان البنكرياس فى مراحله المتقدمة. ان نتائج علاج حالة المرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس فى مراحل متقدمة لا يزال فى مستويات ضئيلة غير مرضية. للمرضى الذين يفشلون فى الإستجابة للعلاج الكيماوي بعقار جيمسيتابين تكون الخيارات العلاجية المتاحة خيارات محدودة و ذات نتائج ضعيفة. كما اقترحنا أن المرضى الذين يعانون من مرض ثابتة أو استجابة تابعة بادئ العلاج الكيماوي على أساس خط جيمسيتابين قد تستفيد من العلاج بعقار كابيسيتابين بجرعات صغيرة ممتدة. بالنسبة لأولئك المرضى الذين تلقوا هذا العلاج و حدثت زيادة فى الورم ، قمنا بتقييم دور دوسيتاكسل كخط علاجى آخر من العلاج الكيماوي.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

استفادة مرضى سرطان الكبد فى مرحلة تشايلد "ب" من العلاج الكيماوى الممتد بجرعات صغيرة

طريقة البحث:

سرطان الكبد هو الخامس أكثر أنواع السرطان شيوعا في جميع أنحاء العالم. وقد اقترح العلاج الكيماوي الممتد بجرعات صغيرة كبديل للعلاجات الكيماوية التقليدية. الآثار العلاجية لهذه الطريقة من الدواء ويبدو أن تأثير العلاج لأعلى تثبيط تكوين اوعية دموية جديدة جنبا إلى جنب مع الحد من السمية الحادة. هذه الميزات من العلاج الكيماوي الممتد بجرعات صغيرة مفيدة بشكل خاص في المرضى الذين يعانون من سرطان الكبد، حيث يتميز هذا النوع من السرطان عن طريق الأوعية الدموية والأوعية الدموية الغنية. ويرتبط أيضا مع العلاج الكيماوي الممتد بجرعات صغيرة تخفيض سمية العلاج الكيماوي التقليدي ذات الصلة، والتي هي أكثر ضررا في مرضى التليف الكبدى. ان المرضى الذين يعانون من تليف الكبد المصاحب بسرطان الكبد بتقييم تشايلد فئة "ب و س" فى وظائف الكبد، لا يوجد لهم علاجات آمنة ذات فاعلية عالية او مقدار سلامة موثق فى حالاتهم.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/31

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

آثار ثورة 25 يناير على علاج سرطان القولون

طريقة البحث:

بعد ثورة 25 يناير 2011، مرت مصر بفترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي اثرت على ممارستنا الطبية اليومية، وحيث أن هناك عدد كبير من المرضى يعتمدون على الدعم الحكومي للحصول على الأدوية إما عن طريق "نظام التأمين الصحي" أو من خلال "نظام العلاج في نفقة الدولة". كما تم تغيير العديد من الحكومات منذ قيام الثورة والأخبار تؤكد وجود أزمة اقتصادية حادة، و لذلك حاولنا تقييم أثر الوضع الحالي على نمط الرعاية الطبية لمرضى السرطان.

ونحن قمنا بتقييم علاج سرطان القولون والمستقيم كنموذج لتقييم الرعاية المقدمة لمرضى السرطان. و عن طريق مراجعة ملفات المرضى حول زيادة عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الدعم المالي، وتوافر الأدوية عن طريق الفم و العقاقير الموجهة الأكثر تكلفة قبل وبعد الثورة.