



كلية التمريض

نعناعة محمود عبد الوهاب

اسم الباحث:

تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

تقليل قلق الامهات لدخول أطفالهن وحدة العناية المركزة للاطفال

طريقة البحث:

يعتبر دخول الطفل وحدة العناية المركزة من أهم مصادر القلق والتوتر النفسى ليس فقط للامهات ولكن أيضا للاطفال .



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**ادراك الاباء لوزن أطفالهم فى عمر ما قبل المدرسة**

طريقة البحث:

ان معدل انتشار السمنة بين الاطفال قد زاد فى السنوات الماضية ولقد لعبت معرفة الاباء لاوزان اطفالهم دورا هاما فى محاربة السمنة والتدخل المبكر لمنع المشاكل التى تسببها السمنة .  
الهدف من البحث:  
و تهدف هذه الدراسة الى تقييم ادراك الاباء لاوزان اطفالهم فى عمر ما قبل المدرسة .



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

**تأثير التدليك العلاجي على تخفيف الألم والتعب عند الأطفال المصابين بالسرطان**

طريقة البحث:

لقد أصبح العلاج التكميلي أكثر استخداما في مراكز علاج السرطان ويعتبر التدليك العلاجي أحد الوسائل الأكثر أمانا واستخداما في علاج الألم للأطفال المصابين بالسرطان .



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

### العادات الصحية بين البنات المراهقات في المدارس الثانوية

طريقة البحث:

سن المراهقة هو مرحلة النمو التي يتغير فيها الطفل من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ فهي تتميز بكثير من تغيرات البلوغ ويصاحبها النمو العقلي والاجتماعي وهي تبدأ من 12 الى 20 سنة . لابد من توجية اهتمام الاب والام وايضا الصحيين المهنيين لاحتياجات هذه المرحلة . طبقا لمنظمة الصحة العالمية ان الاطفال في سن المراهقة يمثلون خمس سكان العالم وفي جمهورية مصر العربية يمثلون ثلث سكان مصر . من السهل ان نحافظ على نظام الحياة الصحي لهؤلاء ولكن ذلك ياتي عندما نعلمهم السلوك الصحي في الحياة .



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/10/02

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

**دراسة مقارنة: تحسين التوعية للرعاية الصحية لأمهات الأطفال الذين يعانون من أنيميا البحر المتوسط باستخدام وسائل التثقيف الصحي**

طريقة البحث:

الثلاسيميا من أهم أمراض الدم الوراثية الانحلالية – التي تسبب تكسر كريات الدم الحمراء الشائعة على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص – وأنيميا البحر المتوسط نوعان وهما: الألفا والبيتا. وتتفاوت نسبة الناقل من 6 إلى 10% في مصر وتقريبا يصاب 1000 لكل 1,5 مليون مولود بالسنة بالثلاسيميا ويزيد عدد المرضى بثبات ليصل لأكثر من 2000 حتى 2003 في مركز علم الدم في جامعة القاهرة. ويكون 60% من المرضى أقل من 10 سنوات و30% من 10: 18 سنة.